



AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES



BRETAGNE

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n°22 du 16 août 2001 - 2 pages

Cultures Légumières

lutte raisonnée

ARTICHAUT

PUCERONS

COTES D'ARMOR - ILLE ET VILAINE:

Les populations de pucerons se maintiennent à des niveaux très faibles.

Les auxiliaires sont présents, on observe surtout des punaises anthocorides.

Il est inutile d'intervenir contre les pucerons pour le moment.

CHOU

MOUCHE DU CHOU

Finistère

Pour la majorité des parcelles suivies, les niveaux de ponte de mouche ne dépassent pas les seuils d'intervention. Restez vigilant car localement les pontes peuvent être plus importantes. Surveillez vos parcelles en observant les pontes éventuelles à la surface du sol aux pieds des plants. Si les œufs ne sont pas visibles, grattez doucement la surface du sol.

Prévoir une intervention uniquement en présence d'œufs pour les plantations récentes non protégées ou les plantations de plus de 20 jours n'ayant reçues qu'un traitement de semences. Protégez également les plantations en cours (traitement de sol ou des plaques ou bâchage).

Pour les autres plantations ayant reçues une protection (traitement de sol ou des plaques), il n'est pas nécessaire d'intervenir.

Pour les pépinières, prévoir une protection pour les semences non traitées (traitement ou bâchage).

Ille et Vilaine - Cotes d'Armor

L'activité des mouches est faible.

Il est inutile d'intervenir contre la mouche pour le moment. Pour les pépinières, prévoir une protection pour les semences non

traitées (traitement ou bâchage).

PUCERONS - TEIGNES - PIERIDES - ALTISES

Finistère - Cotes d'Armor

L'observation fait état en majorité de petits foyers de pucerons cendrés avec par endroit quelques foyers plus importants, mais on constate toujours une bonne régulation par les parasites naturels. Globalement les populations de teignes sont peu importantes mais tout de même présentes dans de nombreuses parcelles. Des adultes de piérides sont observés sur toutes les zones ainsi que des pontes et quelques chenilles. Localement on observe des populations d'altises (feuilles perforées) mais limitées à quelques parcelles.

D'une manière générale, compte tenu de la faible pression de ces ravageurs et de la bonne régulation naturelle, il est inutile d'intervenir.

En cas de forte présence d'altises sur jeunes plants, prévoyez un traitement spécifique. De nombreuses spécialités commerciales sont disponibles (produits à base d'alphaméthrine, de deltaméthrine, de cyperméthrine ou de lambda-cyhalothrine). Parmi ces spécialités, de nombreuses sont également autorisées contre les teignes et les piérides (voir Avertissement Agricole n°16 du 05 juillet 2001).



Prochain
bulletin : le 22
août 2001



Artichaut:
très faible popula-
tion de pucerons.

P74

DRAF Bretagne
Service Régional de la
Protection des Végétaux
B.P. 60116
35701 RENNES CEDEX

Imprimé à la station
D'Avertissements
Agricoles de Rennes
Directeur gérant :
P. BLANCHET
Publication périodique
C.P.P.A.P. n°528 AD
ISSN n°1167-2382

Tarif Courrier 555 Frs -
Fax 655 Frs - Courrier
électronique 355 Frs

CULTURES BIOLOGIQUES

CHOU

MOUCHE DU CHOU

Les données d'observation sur l'activité des mouches du chou sont également valables pour la rubrique Cultures Biologiques (réseau d'observation comprenant également des parcelles en agriculture biologique).

La détermination des pics d'activité doit permettre une meilleure gestion de la protection par bâchage des pépinières ou des plantations (seul moyen de protection actuellement efficace pour ce mode de production).

COTES D'ARMOR-ILLE ET VILAINE-FINISTERE

Compte tenu de la faible activité des mouches, les cultures en place n'ont pas besoin de protection. Par contre, maintenir la protection des pépinières par bâchage.

PUCERONS - TEIGNES - PIERIDES

D'une manière générale, compte tenu de la faible pression de ces ravageurs et de la bonne régulation naturelle, il est inutile d'intervenir.

ARTICHAUT

PUCERONS

COTES D'ARMOR-FINISTERE-ILLE ET VILAINE

Les populations de pucerons verts et noirs sont quasiment inexistantes pour l'ensemble des parcelles.

De nombreuses punaises prédatrices de pucerons et quelques larves de coccinelles sont observées. Une bonne régulation par les auxiliaires est observée.

Compte tenu du faible nombre de pucerons verts et noirs, il est inutile d'intervenir contre les pucerons.